



## Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España

### Con motivo de las celebraciones en torno al Orgullo Gay Madrid 2018

**LA AEHVE ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE INFECCIONES Y REINFECCIONES POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C ASOCIADO A PRÁCTICAS SEXUALES DE ALTO RIESGO ENTRE HOMBRES QUE PRACTICAN SEXO CON HOMBRES (HSH)**

-Propone articular un plan de microeliminación en este colectivo que aúne campañas de información, cribado sistemático y tratamiento de la hepatitis C en la fase aguda como medida de prevención, incluso en pacientes ya tratados y curados

-La universalización del tratamiento anti-VHC basado en antivirales de acción directa (AAD) ha permitido el descenso drástico de la coinfección VIH/VHC (del 63,8% de 2015 al 8% de 2017), pero los expertos están preocupados por el aumento de las reinfecciones

-Estudios realizados en grandes ciudades europeas sitúan hasta en un 26% la prevalencia de la reinfección tras la curación de la hepatitis C en HSH que mantienen prácticas de alto riesgo

-La AEHVE ha iniciado en las redes sociales una campaña para que los HSH eviten las situaciones de riesgo que puedan favorecer tanto las nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C como las reinfecciones después de la curación.

-Las prácticas sexuales de alto riesgo y compartir material para el consumo de drogas son las principales situaciones que se deben evitar

-“Aunque estés curado, puedes re infectarte”, es el mensaje que los especialistas quieren que llegue a este colectivo: el tratamiento no es una vacuna.

**Madrid, 3 de julio de 2018.-** Con motivo de las celebraciones en torno al Orgullo Gay Madrid 2018, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a sociedades científicas y asociaciones de pacientes, ha advertido del aumento del número de reinfecciones por el virus de la hepatitis C entre hombres que practican sexo con otros hombres (HSH), especialmente en grandes ciudades.



Plataforma de Afectados por Hepatitis C Madrid



Por ello, ha propuesto articular para este grupo de personas un plan de microeliminación que aúne prevención y cribado sistemático, y que se oriente al objetivo de eliminar la hepatitis C en pacientes coinfectados con el VIH y el VHC, también en aquellos ya tratados y curados.

Y es que, aunque la prevalencia de la infección activa por el virus de la hepatitis C (VHC) en pacientes coinfectados por el VIH en España ha descendido drásticamente (del 63,8% de 2015 al 8% de 2017) gracias a la extensión del tratamiento anti-VHC basado en antivirales de acción directa, los expertos están preocupados por el problema de las reinfecciones por el virus de la hepatitis C en HSH ya tratados y curados.

Así, estudios realizados en grandes ciudades europeas sitúan hasta en un 26% la prevalencia de la reinfección en pacientes curados. Aunque la situación en España es mejor, el coordinador de la AEHVE, el Dr. Javier García-Samaniego Rey, jefe de la Sección de Hepatología del H.U. La Paz, alerta de que “el aumento de las reinfecciones obliga a continuar con las políticas de prevención primaria (educación) y secundaria (cribado sistemático) en HSH ya curados, además de tratar los casos de hepatitis C aguda como medida de prevención”.

Según el Dr. Juan Berenguer, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del H. Gregorio Marañón y miembro de la Comisión Ejecutiva de la AEHVE, “en los últimos quince años, y especialmente en las grandes ciudades, se han venido describiendo distintos brotes de hepatitis C aguda en HSH con o sin coinfección por el VIH que refieren prácticas sexuales no seguras como única vía de adquisición potencial del virus”. “En la mayor parte de estos casos, además, existían factores facilitadores como las prácticas sexuales con mayor riesgo de sangrado, como el *fisting* o el uso de juguetes sexuales, un elevado número de parejas diferentes, el sexo asociado al consumo de drogas (chemsex) y la presencia de infecciones de transmisión sexual que pueden cursar con ulceraciones genitales”, explica.



Plataforma de Afectados por Hepatitis C Madrid



En este contexto, la AEHVE ha querido aprovechar las celebraciones con motivo del Día del Orgullo Gay para iniciar en las redes sociales una campaña que tiene por objetivo alertar sobre las situaciones de riesgo que pueden llevar a una reinfección por el VHC: consumo de drogas, tatuajes y *piercings* sin esterilizar y, sobre todo, sexo no seguro son las situaciones que se deben evitar, también en todos aquellos que han sido tratados y curados. “Aunque estés curado, puedes re infectarte”, es el mensaje que los especialistas quieren que llegue a este colectivo, porque el tratamiento no es una vacuna.

**En la celebración del #orgullo, toma conciencia de la #hepatitis C, evita las situaciones de riesgo y ante la duda, hazte la prueba, aconsejan los expertos.**

***Para más información, contacte con Manuela Hernández. Tomás Muriel. Gabinete de Prensa de la AEHVE. 954 62 27 27/651 86 72 78/***



Plataforma de Afectados por Hepatitis C Madrid

