



<http://dx.doi.org/10.17579/RevPatDual.10.18>



Comunicaciones Orales

EPIDEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DUAL

¿QUÉ IMPACTO TIENE EN LA ACTUALIDAD LA GENÉTICA EN ADICCIONES Y PATOLOGÍA DUAL?

Ricardo Heffel, Nayla Yael Farez, María Clara Civetta, María Florencia Leonard, Luisina Palma

Universidad Nacional de Rosario. Argentina

Los estudios de epidemiología genética han manifestado que las adicciones tienen una moderada a alta heredabilidad. Estas investigaciones también han evidenciado que los factores ambientales y genéticos contribuyen a las diferencias individuales en la vulnerabilidad a las adicciones. Se espera que la influencia de la genética esclarezca el diagnóstico y el conocimiento de la fisiopatología de estas enfermedades, así como también contribuya en la prevención y el tratamiento de las mismas.

En esta comunicación abordaremos el impacto de la genética en relación con la dependencia a diversas sustancias o experiencias, reconociendo que la expresión de un gen no determina la aparición de esta enfermedad, sino la asociación del mismo a distintos factores ambientales, sociales y/o psicológicos.

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL EN POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS

María del Carmen García Mahía¹, María Vidal Millares², Raimundo Mateos Álvarez³

¹Hospital Abente y Lago (XXIAC). Facultad de Medicina Santiago de Compostela. A Coruña. ²Hospital Virxe da Xunqueira. Cee, A Coruña. ³Facultad de Medicina. Santiago de Compostela, A Coruña

Objetivos: a) Estudiar la prevalencia de abuso o dependencia de alcohol en la población gallega mayor de 60 años de edad; y b) análisis de prevalencia en función de otras variables clínicas y sociodemográficas.

Métodos: Estudio epidemiológico transversal en dos fases, realizado sobre una muestra 3580 personas, representativa de la población gallega mayor de 60 años y estratificada por Área Sanitaria. Como instrumentos se utilizaron el GHQ (Cuestionario General de Goldberg) en su versión de 28 ítems, con un punto de corte de 10/11, en la primera fase y la entrevista psiquiátrica DIS-III (Diagnostic Interview) en la segunda fase, así como diversos cuestionarios sobre aspectos clínicos y sociodemográficos.

Resultados: La prevalencia de abuso o dependencia de alcohol en la muestra estudiada fue 1.4% con mayor prevalencia en varones, especialmente en el grupo de 66 a 75 años. El análisis de variables sociodemográficas muestra que las clases sociales más desfavorecidas presentan las mayores prevalencias de abuso o dependencia de alcohol que también es mayor en no-casados respecto al resto de la muestra. Los sujetos con abuso o dependencia de alcohol presentan baja conciencia de enfermedad con bajo nivel de búsqueda de ayuda, comparados con el resto de la muestra.

Conclusiones: Aunque la prevalencia del diagnóstico de abuso o dependencia de alcohol no parece ser muy elevada en la población gallega mayor de 60 años, es necesario diagnosticar y tratar adecuadamente a este grupo de población debido a las elevadas tasas de comorbilidad y al impacto en la salud física del consumo excesivo de alcohol en edades avanzadas.